LONGICORNES

DES VOYAGES DU Dr E. FROMONT AU BRÉSIL ET A LA PLATA

PAR

Auguste LAMEERE

— SÉANCE DU 2 AOUT 1884 —

PREMIER VOYAGE.

FAM. CERAMBYCIDÆ.

1. *Compsocerus aulicus* Thoms. — Buenos-Ayres (Flores), 26 novembre 1883.
   3 ex. sur des fleurs de sureau.
2. *Mallosoma zonatum* Sahlb. — Rio-Janeiro (Jardin botanique), 15 novembre 1883.
   1 ex. pris au vol dans un endroit humide et ombragé.

FAM. LAMIIDÆ.

3. *Esthlogena prolixa* Bates. — Rio-Janeiro (Jardin botanique), 15 novembre 1883.
   1 ex. pris en fauchant sur des ombellifères.

4. **Lophopœum Timbouvæ** nov. sp.

Curtulum, minus depressum, postice rotundato-attenuatum, ferrugineum subtus pube grisea indutum, supra fusco, cinereo, luteoque variegatum, elytris lateribus vix carinatis, carina centro-basali elevata nigro setosa, disco plagis tomentosis cinereis, ochraceis, luteis atque carneis ornato. — Long., 9 mill.; lat., 3 1/2 mill.

Hab.: Brasilia merid. — Typus in Mus. nostro, ♀.

Court et bombé, d'un brun ferrugineux. Tête recouverte sur le front d'un fin duvet grisâtre; yeux bordés en arrière d'une ligne de duvet jaune qui limite également un espace triangulaire d'un

noir brunâtre de chaque côté de la ligne médiane sur le vertex ; antennes à base des articles à partir du troisième d'un jaune testacé, à premier article flexueux en dessus et en dessous, sans tubercule à son extrémité. Prothorax à épines latérales situées au milieu de ses côtés, couvert de gros points enfoncés, varié de jaune et d'ochracé et orné de chaque côté sur le disque et sous l'épine latérale de deux espaces noirs bordés de duvet jaune. Écusson jaune, bordé latéralement de noir. Élytres régulièrement atténuées de la base à l'extrémité, qui est obliquement tronquée, à carènes latérales indistinctes et à carènes basilaires saillantes et ornées d'une crête de poils noirs, offrant presque jusqu'à l'extrémité de nombreux points enfoncés, variées d'espaces de duvet jaune, ochracé, cendré et chair, les espaces ochracés situés à la base et sur le repli épipleural, les espaces cendrés en arrière des carènes basilaires, les espaces jaunes sur le disque, à peu près vers le milieu, et les espaces chair postérieurement. Dessous du corps recouvert d'une fine pubescence grisâtre, variée de jaune sur les épisternums méso- et métathoraciques. Pattes recouvertes d'un duvet grisâtre, à massue des fémurs rembrunie en dessus et ornée avant leur extrémité d'un demi-anneau supérieur noirâtre ; tibias brunâtres annelés vers le milieu de blanc jaunâtre ; tarses ferrugineux à premier et dernier articles blanchâtres sur la plus grande partie de leur longueur.

Cette charmante espèce a beaucoup de rapports avec le *L. cristatulum* Bates, dont elle doit différer principalement par sa coloration. M. le Dr Fromont l'a rencontrée sous ses premiers états dans le Jardin botanique de Rio-Janeiro, le 15 novembre 1883. La ♀ qui a servi à faire cette description est éclose à bord le 2 janvier 1884; notre collègue en a généreusement enrichi ma collection, m'annonçant qu'il préparait la description des métamorphoses de cette espèce, qui sont tout à fait exceptionnelles pour un Longicorne.

5. *Phytœcia sanguinicollis* Burm. — Buenos-Ayres (Flores), 26 novembre 1883.
1 ex.

DEUXIÈME VOYAGE.

FAM. CERAMBYCIDÆ.

6. *Oxymerus rivulosus* Germ. — Une femelle prise sur un trottoir à Montevideo, le 8 mars 1884.

TROISIÈME VOYAGE.

LAMIIDÆ.

7. *Adetus pygœus* Bates.
8. *Estola varicornis* Bates.

1 exemplaire de chacune de ces espèces capturé à Rio-Janeiro (Botafogo), le 28 août 1884, dans les feuilles crispées d'une plante inconnue.